

تصور الممرضات تجاه تأثير استخدام بروتوكول منع مخاطر سقوط المرضى بالمستشفى

اسم الطالب: عائشة رمضان العنزي

اسم المشرف: د.د. عايدة السيد الجميل

المستخلص

سقوط المرضى هي مصدر قلق واسع النطاق في المستشفيات الإعداد. سقوط المرضى هو حدث غير متوقع حيث يأتي الفرد بسقوطه على الأرض أو مستوى أقل. الوقاية من السقوط هي إدارة مخاطر مستشفى ملحة جدا وتحديات سلامة المرضى بسبب العديد من المرضى المنومين القابلين لمشاكل السقوط، أو الإصابة الناجمة عن السقوط المهدف منه: هو تقييم إدراك الممرضات لفعالية استخدام بروتوكول الوقاية من خطر سقوط المرضى في المستشفى. طريقة البحث: استخدم في البحث التصميم العددي الوصفي المقطعي واشتملت عينة البحث على ٢٠٤ ممرضة من مستشفى جامعة الملك عبد العزيز شارك في البحث: اداة البحث المستخدمة عبارة عن استبيان وتم تقسيم الاستبيان إلى ٣ أجزاء: الجزء الأول يشمل البيانات الديموغرافية الاجتماعية، ويتضمن الجزء الثاني ٤٤ عامل من العوامل محتملة الحدوث والتي تؤدي إلى حدوث إصابات خطيرة في المرضى البالغين من العمر ٢١ سنة أو أكثر. ويتألف الجزء الثاني من ٤٠ سؤال الرعاية المقدمة لمنع حدوث حالات إصابة خطيرة في المرضى البالغين. تحليل النتائج: تم إجراء التحليل الإحصائي باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) الإصدار ٢١. وقد استخدمت الوسائل والانحرافات المعيارية لوصف المتغيرات المستمرة والتردد والنسبة المئوية المستخدمة لوصف

المتغيرات الفعوية والثائية. وتم الالتزام الصارم بقواعد السلوك الأخلاقي في جميع مراحل المشروع. النتيجة كانت هناك علاقة خطية إيجابية كبيرة بين مخاطر الانخفاض المتوقعة والوقاية من مخاطر الوقوع المتصورة. وكانت هناك علاقة معنوية بين مخاطر السقوط المتصورة ومستشفى التدخل التمريضي. التدخل التمريضي المعتمد: مما يدل على أن الممرضات ينظرن إلى التدخل التمريضي على أنه أكثر فائدة في تحقيق أنواع سقوط أكثر قابلية للوقاية منها.

والممرضات اللواتي يأتون من الاقسام العامة ينظرن إلى مستويات أعلى بكثير من مخاطر الانخفاض المتوقعة، وهي أكبر من مخاطر الوقوع التي يمكن الوقاية منها. الاستنتاج: يستنتج أن الممرضات تقترب من تصور الممرضات كان لمعرفة العلاقة بين ما يعتبره الممرضون من مخاطر عالية من السقوط وما يعتبرونه يمكن الوقاية منها من تلك العوامل الخطرة. من ناحية أخرى، بل هو أيضا هدف يمكن تحقيقه من الدراسة الحالية للعثور على التدخلات الأكثر شيوعا التي تمنع حدوث السقوط على الممرضات الممارسات اليومية.

الكلمات الرئيسية: إدراك الممرضات، منع سقوط المرضى والمرضى المعرضين للسقوط.

NURSES' PERCEPTION TOWARD THE EFFECTIVENESS OF USING RISK FALL PREVENTION PROTOCOL OF HOSPITALIZED PATIENTS.

Aisha Ramadan Alenzy

Prof .Dr .Aida Elsayed Elgamil

Abstract

Background: Falls are a widespread concern in hospitals setting. Fall is an unexpected event in which an individual comes to rest on the ground floor or lower level. Fall prevention is a very pressing hospital risk management and patient safety challenge due to many of in-patient admitted for mobility problems, falls, or injury from falls making. **Aim :** the study aimed to assess nurses' perception of the effectiveness of using fall prevention protocol of risk fall hospitalized patients. **Research design** the study is quantitative descriptive cross-sectional design. **Sample:** A convenience sample of 204 nurse from KAUH. **Tools:** "Assessment of the injurious fall risk factors and fall prevention intervention questionnaire". It consist of three parts: part I includes socio demographic data, part II includes 44 potential factors that may lead to an injurious fall in adult inpatients. Part II of the tool consists of 40 interventions for preventing injurious falls in adult inpatients. **Result** There was a weak significant positive linear relationship between perceived fall risks and the perceived preventability of risks of fall , the adopted Nursing Intervention and effectiveness of nursing Interventions were correlated strongly .Nurses who coming from the General Units perceived significantly higher frequently perceived fall-risks, greater Perceived preventable risks of fall. **Conclusion:** It is concluded that nurses' approaching the nurses' perception was to figure out the relationship between what nurses consider to be high risk of falls and what they perceive as preventable of those risk factors. On the other hand, it is also an achievable objective of the current study for finding the most frequent interventions as perceived by nurses that are preventing falls to occur on daily practices. **Recommendation:** all nurses should be motivated and encouraged to attend regular continuous education of programs every six months for risk fall and prevention measures.

Key Words: nurses perception, fall prevention, risk factors and hospitalized patients.